ESTUDIO FLORÍSTICO DEL PEDREGAL DE ARÓCUTIN, EN LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, MÉXICO*

Por María Eugenia Molina-Paniagua

y

Sergio Zamudio Ruiz
Instituto de Ecología, A.C.
Centro Regional del Bajío
Pátzcuaro, Michoacán

RESUMEN

El pedregal de Arócutin se localiza en la cuenca del lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, en la provincia fisiográfica denominada Cinturón Volcánico Transmexicano, ocupa una superficie aproximada de 31 km².

La vegetación que se encuentra en esta zona es un bosque de *Quercus* en diferentes etapas de desarrollo, que alterna con matorrales formados con elementos del bosque tropical caducifolio. Se describe la estructura y composición florística de cada una de las asociaciones que lo conforman.

Las colectas de ejemplares botánicos durante dos años dieron como resultado el registro de 407 especies de plantas vasculares, incluidas en 262 géneros y 96 familias; lo que representa 38.76% del total de especies de la flora de la cuenca del Lago de Pátzcuaro. Las familias mejor representadas son: Compositae con 60 especies, Leguminosae con 27, Labiatae con 19 y Gramineae con 18.

Al comparar la lista florística del pedregal de Arócutin con la de otros pedregales del Cinturón Volcánico Transmexicano, utilizando el Índice de Similitud de Sørensen, se encontró que tanto a nivel genérico como específico la mayor rela-

* Versión modificada de la tesis profesional presentada por la primera autora en la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán.

ción del pedregal de Arócutin se da con el de Huaniqueo, Michoacán; siendo menor la similitud con los pedregales de San Ángel, Distrito Federal y Chichinautzin, Morelos.

Adicionalmente se registran los usos tradicionales de algunas de las plantas.

ABSTRACT

The pedregal of Arócutin, with a surface area of approximately 31 km², is located in the Lake Pátzcuaro basin, in the northern portion of the Mexican state of Michoacán. This region belongs to the Trans-Mexican Volcanic Belt physiographic province.

The vegetation found is an oak forest in different stages of succession, intermixed with elements of tropical deciduous forest. The structure and floristic composition of each association is described.

Intense botanical exploration for a period of two years resulted in the collection of 407 species of vascular plants, belonging to 262 genera and 96 families; these represent 38.76% of the total number of species in the Lake Patzcuaro basin. The most diverse families are: Compositae with 60 species, Leguminosae with 27, Labiatae with 19, and Gramineae with 18.

Comparing the floristic list of the pedregal of Arócutin with those of three other outcrops of basaltic rocks along the Trans-Mexican Volcanic Belt, using the Sørensen similarity index, we found that the Arócutin and Huaniqueo pedregals are the most closely related, both at generic and specific level. This is followed by the pedregal of San Ángel in Mexico City and finally the pedregal of Chichinautzin, Morelos.

Additionally, traditional uses of some plants are recorded.

INTRODUCCIÓN

La región del Cinturón Volcánico Transmexicano, se caracteriza por la presencia de numerosos conos volcánicos con diferentes edades. Uno de los eventos geológicos más recientes es la ocurrencia de derrames lávicos que han dado origen a cuantiosos "pedregales" o "malpaíses" que se encuentran dispersos en esta región.

El pedregal de Arócutin se formó por una corriente de lava ocurrido en la ladera noreste del Cerro La Taza, que cubrió una superficie aproximada de 31 km² cerca del borde suroeste del Lago de Pátzcuaro. A pesar de su pequeño tamaño,

los registros previos de plantas revelan que éste contiene un porcentaje significativo de la biota de la cuenca de Pátzcuaro. Por otra parte, Chávez-Carmona (1999) menciona que el pedregal es un área de recarga de agua por infiltración subterránea, aporte que es fundamental para mantener el equilibrio hidrológico regional; también representa un hábitat donde se desarrollan especies vegetales con adaptaciones particulares al ambiente. En este trabajo se aborda el estudio de la vegetación y la flora que caracterizan a este malpaís.

Son pocos los estudios que hacen referencia al pedregal de Arócutin; se trata en su mayor parte de trabajos sobre la flora y vegetación de la cuenca del Lago de Pátzcuaro y sólo mencionan al pedregal de manera colateral. Entre ellos destacan los de Guevara-Féfer et al. (1981), Barrera-Bassols (1986) y Caballero et al. (1986).

Díaz-Barriga y Bello (1993) describieron para la zona de estudio un encinar más o menos abierto de *Quercus castanea*, en el que distinguieron tres estratos: el arborescente de 5 a 7 m de alto, el arbustivo de 3 a 5 m de alto y el herbáceo menor de 1 m.

Chávez-Carmona (1999), al realizar una recopilación de los estudios que se han efectuado en los pedregales de Arócutin y del sur de Pátzcuaro, citó 65 especies de plantas con flores para el área de estudio.

Los investigadores y colectores del Centro Regional del Bajío del Instituto de Ecología A.C. han llevado a cabo visitas esporádicas en esta área desde 1985, como parte de la etapa de exploración para el desarrollo del proyecto "Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes". Las plantas recolectadas en estas excursiones, así como las obtenidas durante la preparación del presente trabajo se encuentran depositadas en el herbario de este Centro (IEB).

MÉTODOS

La delimitación del pedregal de Arócutin se realizó con base en la carta topográfica Cherán, E14A21, escala 1:50,000 (Anónimo, 2000a); y la descripción del área se basó en las cartas edafológica y geológica Cherán E14A21, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática (INEGI) y en la literatura consultada (Anónimo, 1978, 1982).

Por otro lado, de diciembre de 2002 a noviembre de 2004 se realizaron 31 excursiones botánicas a diferentes localidades del área, tratando de cubrir la mayor parte de la zona de estudio. Durante estos recorridos se colectaron 606 muestras de las plantas que se encontraron con flores y/o frutos, las que se secaron y herborizaron siguiendo la metodología botánica convencional (Lot y Chiang, 1986). La identificación del material se realizó en el Centro Regional del Bajío, en Pátzcuaro

utilizando las claves y descripciones disponibles en la literatura especializada así como el herbario del mismo.

Para elaborar el mapa de vegetación se utilizaron fotografías aéreas a escala 1:25,000 tomadas por el INEGI en el período 1990-1992, las que se interpretaron por estereoscopía, verificando la fotointerpretación con observaciones hechas en campo; posteriormente, las unidades reconocidas se transfirieron a un mapa topográfico, usando como base la carta Cherán, E14A21, con escala 1:50,000 también del instituto antes mencionado. La vegetación se clasificó de acuerdo con los tipos descritos por Rzedowski (1978).

ÁREA DE ESTUDIO

El pedregal de Arócutin, también llamado pedregal de Tócuaro o de Nocutzepo, se encuentra en el fondo de la cuenca, cerca del extremo suroeste del lago de Pátzcuaro, al sur de Erongarícuaro y a 12 km al noroeste de la ciudad de Pátzcuaro. Tiene una superficie aproximada de 31 km². Está delimitado por los paralelos 19°33'59" y 19°30'56" de latitud norte y los meridianos 101°41'34" y 101°44'37" de longitud oeste. La altitud varía de 2060 a 2360 m s.n.m.; la principal prominencia es el volcán La Taza, que se localiza en el extremo suroeste, y es el que dio origen al pedregal (Anónimo, 2000a) (Fig. 1).

El pedregal de Arócutin está rodeado por extensos campos de cultivo y las siguientes poblaciones: al norte San Francisco Uricho, al noroeste Santa María Arócutin, al suroeste Santo Tomás Tócuaro y San Miguel Nocutzepo, al sur San Miguel Charahuén y al sureste Ajuno. Por el este el pedregal está bordeado por la carretera Pátzcuaro - Erongarícuaro y en el extremo suroeste, por la vía del tren Zacapu - Pátzcuaro - Uruapan (Anónimo, 2000a) (Fig. 1).

Geología

La zona de estudio se encuentra dentro del Cinturón Volcánico Transmexicano en el Corredor Tarasco, en el que se alojan más de mil conos volcánicos de edad reciente, originados como resultado de la actividad magmática que provocó el desplazamiento de la Placa de Cocos. El Corredor Tarasco tiene edificios volcánicos de diferentes edades, que varían de 2.78 millones de años al reciente. Entre los volcanes más jóvenes de esta región se encuentran el Jorullo, emergido en 1759, y el Parícutín que surgió en 1942 (Garduño, 1999a).

El pedregal de Arócutin se originó hace 8430 años (Corona-Chávez et al., 2006) debido a un derrame lávico ocurrido en la ladera noreste del volcán La Taza; volcán cinerítico monogenético, cuyo cono está formado por ceniza volcánica, are-

Figura 1. Localización del pedregal de Arócutin, Erongarícuaro, Michoacán, México.

nas gruesas y gravas. En la actualidad se encuentra aún bien delimitado y aunque el cráter en su orilla noreste se aprecia algo erosionado, todavía está bien conservado. El derrame formó un extenso escudo de rocas basálticas que cubren una superficie de 31 km², en el que se aprecia que el flujo basáltico siguió un rumbo SE-NE (Barrera-Bassols, 1986; Garduño et al., 2002).

Garduño (1999b) afirma que el lago era más extenso en otra época y llegaba hasta Erongarícuaro, Ajuno y Arócutin, por lo que supone que antes de la erupción del volcán La Taza ocupaba casi toda el área que actualmente cubre el malpaís. De acuerdo con este autor, en el Holoceno las zonas de Ajuno, Nocutzepo, Arócutin y Uricho fueron levantadas de su posición original; este proceso de levantamiento parece haber ocurrido en dos etapas: la primera en tiempos anteriores al preclásico y la segunda más recientemente. El terreno sufrió un levantamiento por la acumulación de una capa de lava de más de 40 metros de espesor, que seguramente corresponden al malpaís del volcán La Taza (Garduño et al., 2002).

Con base en lo observado en las fotografías aéreas, la corriente de lava no siguió el camino más corto al escurrir hacia el fondo de la cuenca, debido a que una serie de elevaciones situadas en sentido perpendicular a la pendiente principal le obstaculizaron el paso; como este tipo de lava es muy viscosa, se formaron plegamientos en la parte noreste del pedregal a medida que subía de nivel, logró pasar los cerritos que se encontraban al sureste de la zona y siguió fluyendo, hasta toparse con otra zona de relieve que la detuvo.

Edafología

En el pedregal el desarrollo del suelo es incipiente todavía, en su mayor parte la roca basáltica se encuentra expuesta y en donde está cubierta la capa de hojarasca y suelo es muy delgada. Se identifican en general dos tipos de suelo: litosol y andosol (Anónimo, 1982).

Los litosoles son suelos de formación reciente, delgados y superficiales, poco desarrollados, sin horizontes genéticos naturales. Se pueden desarrollar bajo distintos ambientes, en pendientes donde la tasa de erosión excede a la de formación del suelo o en sedimentos arenosos (Gutiérrez et al., 2003).

Cubren aproximadamente 90% de la superficie del pedregal, se desarrollan sobre las rocas basálticas, no presentan un horizonte diagnóstico, su profundidad no es mayor de 15 cm. En estas condiciones son suelos con buen drenaje, debido a que la roca basáltica es bastante permeable y permite la infiltración del agua de lluvia, por lo que representa una zona de recarga acuífera (Barrera-Bassols, 1986).

Los andosoles son suelos que se forman a partir de cenizas volcánicas, por lo que se encuentran en las laderas y en las cercanías del volcán; geológicamente son recientes, tienen una profundidad de 35 a 60 cm, con intemperismo incipiente. La acumulación de materia orgánica es muy alta, y contienen complejos de aluminio y humus; hacia abajo hay traslocación de coloides o perfiles en desarrollo. Tienen densidad aparentemente baja ($>0.9 \text{ g. cm}^{-3}$) y alta capacidad de retención de agua (Brady y Weil, 1999; Anónimo, 1982).

Hidrología

En la zona de estudio la red hidrológica es incipiente e irregular, no existen corrientes superficiales debido a que el sustrato rocoso del pedregal es altamente permeable y el agua de lluvia se filtra rápidamente, lo que aunado a la escasez de suelo y a las pendientes casi nulas, no permiten la retención del agua de lluvia ni el desarrollo de corrientes fluviales (Barrera-Bassols, 1986).

Clima

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen modificada por García (1973), el clima del área corresponde al templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano que se prolongan hasta el otoño, con verano fresco y largo, poca oscilación térmica. La temperatura máxima se presenta antes del solsticio de verano, la fórmula que le corresponde es $C(w_2)(w)b(i)g$.

En la ciudad de Pátzcuaro, la precipitación total anual es de 958 mm, con cinco meses significativamente húmedos (junio-octubre). Los más secos son de febrero a mayo y de noviembre a diciembre. Enero se puede considerar como húmedo, ya que la humedad es mayor que la de los meses secos. La menor precipitación en el mes más seco (diciembre) es de 0.9 mm, mientras que la del más húmedo (julio) es de 245 mm. La temperatura media anual es de 15 °C, la media máxima es de 24 °C, se da en el mes de mayo alcanzando los 28 °C y la temperatura media mínima de 12 °C, siendo enero el mes más frío con -4 a 4 °C (datos obtenidos en un período de dos años en la estación meteorológica del Centro Regional de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CREDES), ubicado en Pátzcuaro, Michoacán).

INFLUENCIA HUMANA EN EL PEDREGAL DE ARÓCUTIN

La región que colinda con el pedregal ha estado habitada desde épocas muy remotas; en la relación de Michoacán se menciona la existencia de varios pobla-

dos a su alrededor desde antes de la llegada de los españoles a la cuenca del Lago de Pátzcuaro (Anónimo, 2000b). Algunos de estos asentamientos humanos todavía se encuentran ubicados cerca del pedregal como son: Ajuno, San Miguel Charahuén, San Miguel Nocutzepo, Santo Tomás Tócuaro, Santa María Arócutin y San Francisco Uricho.

No existen poblaciones dentro del área del pedregal; tampoco se encontraron evidencias de habitaciones prehispánicas en este lugar; no obstante, en el extremo norte, al sur de San Francisco Uricho, existe una zona arqueológica llamada La Tepuza que atestigua la existencia de una civilización antigua establecida en esta localidad. Dentro del pedregal se hallaron numerosas evidencias de actividad humana; hay caminos y veredas que lo cruzan y que comunican a los diferentes poblados entre sí, también se observaron varios sitios en que se trabajó la piedra, supuestamente para elaborar objetos como molcajetes, metates y herramientas para la caza.

La presencia de las poblaciones asentadas en las orillas del pedregal ha ejercido una influencia negativa constante sobre la vegetación y la fauna local. A pesar de lo accidentado del terreno, sus habitantes incursionan en el pedregal para cazar o en busca de frutos y partes de plantas que recolectan para ser usadas como medicinales, comestibles, combustible o para alimento de los animales domésticos. Durante algunos festejos religiosos, particularmente en noviembre, las personas cortan flores de la orquídea *Laelia autumnalis*, (“lirio” o “animecheri tsitsiki”) para el culto a los muertos. La explotación forestal, ocasionada por la extracción de leña para uso doméstico y de madera que utilizan en la construcción de sus viviendas o para hacer artesanías, son algunos de los factores que alteran la comunidad vegetal. También se recolectan hongos para comer y llevar a vender (Anónimo, 2003).

La actividad agrícola no es frecuente, debido a que el suelo no es apto para ello, sin embargo, en la parte central del pedregal entre 2100 a 2130 m s.n.m. se encuentran algunas parcelas de cultivo menores de 100 m²; en estos sitios se han removido las rocas para hacer un mejor aprovechamiento del suelo. En las cercanías de los poblados se observan manchones de vegetación secundaria y al norte de la ex-Hacienda de Charahuén hay dos zonas que están reforestadas con *Pinus* spp. y *Eucalyptus* spp. La ganadería se practica por el método de libre pastoreo, ya que los dueños del ganado bovino llevan a sus animales a pastar libremente en esta zona.

En la actualidad algunas personas de Tócuaro o de otros poblados cercanos se dedican a la elaboración de artesanías, tallan la madera para hacer máscaras, figuras de cristo y de animales y muebles, entre otros. Las plantas maderables que utilizan con mayor frecuencia son: el “copalillo” (*Bursera cuneata*), el “nogalillo” (*Cedrela dugesii*), el “hormiguillo” (*Aralia humilis*), el “madroño” (*Arbutus arizonica*, *A. xalapensis*), “palo blanco” (*Balmea stormae*); estas especies las extraen del pe-

dregal. Otras como el “pino” (*Pinus* spp.), el “fresno” (*Fraxinus uhdei*) y el “cedro” (*Cupressus lusitanica*) las obtienen de los cerros circunvecinos. Mientras que la madera de “caoba” (*Swietenia* sp.) y la de “parota” (*Enterolobium cyclocarpum*), las traen de otras regiones del estado.

También utilizan algunas zonas para la apicultura. Además, del pedregal se extrae piedra y arena, cada vez es mayor el número de bancos de materiales, por lo que de continuar con esta actividad existe el riesgo de que en el futuro el pedregal disminuya su extensión y con ello su biodiversidad.

Aunque algunos habitantes de los pueblos vecinos están seriamente preocupados por la conservación de la flora y la fauna del pedregal, no ha habido iniciativas importantes para lograrlo. Hasta la fecha lo único que se ha hecho en este sentido es “El ordenamiento Territorial Comunitario del Ejido de San Francisco Uricho, municipio de Erongarícuaro, Michoacán” (Pérez y Soto, 2008), en el cual se evaluó la problemática de la zona, la vegetación, la fauna y el agua. También se definieron áreas de aprovechamiento, de restauración, de protección especial y de conservación, quedando como zona de conservación solo 239.17 has de la parte del pedregal que colinda con San Francisco Uricho.

VEGETACIÓN

La vegetación del pedregal de Arócutin se encuentra en un proceso de sucesión primaria, la mayor parte del área está cubierta por elementos característicos de un encinar, que alterna con especies propias del bosque tropical caducifolio (Fig. 2). Este bosque es heterogéneo, por lo que se pueden distinguir diferentes asociaciones como: el bosque de encino con *Quercus castanea* - *Q. obtusata*, bosque de encino con *Quercus castanea*, *Q. obtusata* y *Q. rugosa*, bosque de encino con elementos del bosque tropical caducifolio y matorral secundario.

Bosque de encino (*Quercus*)

En general es un encinar abierto, compuesto principalmente por *Quercus rugosa*, *Q. obtusata* y *Q. castanea*, que se distribuye entre 2060 y 2360 m s.n.m. La densidad y altura de los árboles dominantes, así como de las especies acompañantes es variable, dependiendo del sustrato geológico, el desarrollo del suelo, la microtopografía y la exposición.

Asociación: Bosque de encino con *Quercus castanea* - *Q. obtusata*. Esta asociación ocupa las laderas del volcán La Taza, que tienen una fuerte pendiente de entre 30° y 45°; el sustrato es arenoso y está formado por cenizas volcánicas

Figura 2. Mapa de vegetación del pedregal de Arócutin, Erongarícuaro, Michoacán, México.

y suelo del tipo andosol; las especies dominantes de esta asociación son *Quercus castanea* y *Q. obtusata*, con altura de 12 a 13 m., tiene una distribución casi continua desde 2200 hasta 2360 m s.n.m., y ocupa una superficie de 0.56 km², lo que representa 8% del total del área. En su límite inferior alterna con la asociación bosque de encino con *Quercus castanea*, *Q. obtusata* y *Q. rugosa*.

Las especies que acompañan a los encinos en un estrato más bajo son: los madroños *Arbutus arizonica* y *A. xalapensis*, que llegan a medir hasta 8 m de alto; la presencia de individuos aislados de *Pinus leiophylla* y *P. teocote* es poco frecuente.

El estrato arbustivo, de 2 a 4 m de alto, es muy variable en densidad; entre las especies más comunes que lo componen se encuentran: *Comarostaphylis discolor*, planta que sólo se encontró en las laderas de volcán, *Bursera cuneata*, *Cedrela dugesii*, *Euphorbia calyculata*, *Stevia subpubescens*, *Desmodium bellum*, *Croton adspersus*, *Bouvardia ternifolia*, *Montanoa grandiflora*, *Verbesina greenmanii* y *Ceanothus coeruleus*.

En el estrato herbáceo, de 0.1 a 1 m de alto destacan: *Drymaria villosa*, *Sporobolus indicus*, *Bromus carinatus*, *Phytolacca icosandra*, *Bidens odorata*, *Senecio stoechadiformis*, *Halenia brevicornis*, *Valeriana robertianifolia*, *V. pilosiuscula*, *Muhlenbergia ciliata*, *Diastatea micrantha*, *Salvia lavanduloides*, *Piptochaetium virescens*, *Pleopeltis polylepis*, *Cyperus aggregatus*, *C. seslerioides*, *Commelina tuberosa*, *Gibasis linearis*, *Aphanostephus ramosissimus*, *Peperomia campylo-tropa*, *Aegopogon tenellus*.

Las plantas epífitas son escasas, entre ellas se encuentran: *Laelia autumnalis*, *Tillandsia prodigiosa*, *Peperomia galioides* y *P. quadrifolia*.

En la ladera norte el encinar sigue formado por *Q. obtusata* y *Q. castanea*, pero el estrato arbustivo está dominado por *Verbesina greenmanii*, mientras que en el herbáceo predomina *Croton adspersus* y entre las epífitas son abundantes *Tillandsia dugesii*, *T. juncea* y *Viridantha lepidosepala*. En la ladera sur del volcán la vegetación se encuentra profundamente perturbada, el bosque de encinos ha sido eliminado y en su lugar se desarrolla un matorral denso de 2 a 4 m de alto, en el que predominan *Dodonaea viscosa* y *Tecoma stans*; aislados entre estos arbustos aún persisten algunos elementos arbóreos que han sobrevivido a la explotación, como son: *Quercus rugosa*, *Q. castanea*, *Arbutus arizonica*, *A. xalapensis* y *Crataegus mexicana* que atestiguan que alguna vez existió un bosque mejor desarrollado. La parte suroeste del volcán que está frente al pueblo de Ajuno es la más deforestada, ahí ya no existen árboles, el arbusto dominante es *Croton adspersus* y en el estrato herbáceo predominan *Peperomia campylo-tropa*, *Cheilanthes bonariensis*, *Begonia balmisiana*, *Senecio stoechadiformis* y *Stevia subpubescens*.

Dentro del cráter existe un microclima un poco más húmedo que en la parte externa del volcán; en el estrato arbóreo las especies dominantes son *Quercus castanea* y *Q. obtusata*, que en esta zona llegan a medir hasta 12 m de altura; otras plantas arbóreas presentes son *Pinus leiophylla* y *Crataegus mexicana* de 8 m de altura. El estrato arbustivo está poco desarrollado, mide de 2 a 4 m de alto, los elementos predominantes son *Psacalium megaphyllum*, *Cirsium anartiolepis*, *Baccharis conferta* y *Stevia salicifolia*.

Los elementos herbáceos son muy abundantes, están mejor representados durante la temporada de lluvias (mayo a octubre), cuando crecen profusamente; mientras que en la época seca del año la mayoría desaparece ya sea por ser plantas anuales o porque las partes aéreas se secan quedando vivas las subterráneas, que retoñarán hasta la temporada de lluvias del año siguiente; este estrato mide entre 10 cm y 1 m de altura y en él son importantes: *Hyptis mutabilis*, *Guardiola mexicana*, *Spiranthes schaffneri*, *Polygala subalata*, *Ranunculus petiolaris* var. *petiolaris*, *Piptochaetium virescens*, *Lithospermum distichum*, *Cyperus aggregatus*, *Physalis volubilis*, *Plantago australis* ssp. *hirtella*. Los helechos aquí son muy abundantes, entre ellos se encuentran principalmente: *Cheilanthes bonariensis*, *Woodsia mollis*, *Botrychium virginianum*, algunos como *Pteridium aquilinum* var. *feei* y *Dryopteris rossii* alcanzan un metro de altura.

Asociación: Bosque de encino con *Quercus castanea*, *Q. obtusata* y *Q. rugosa*. Esta asociación se encuentra en la zona más húmeda ubicada al suroeste del pedregal, se extiende al norte de la Ex-Hacienda de Charahuén y al noroeste de Tócuaro, formando una franja que rodea casi por completo al volcán, entre 2100 y 2200 m s.n.m., con 15.33 km², lo que representa 48.93% del área total; se desarrolla sobre rocas basálticas y suelo delgado del tipo litosol; al oeste alterna con la asociación del bosque de encino con *Quercus castanea* - *Q. obtusata* y al este con la del bosque de encino-bosque tropical caducifolio.

En esta zona es donde el encinar está mejor desarrollado, regularmente es abierto, mientras que en las cañadas se hace más exuberante y cerrado. Está compuesto principalmente por *Quercus castanea*, *Q. obtusata* y *Q. rugosa*, las que acompañan a *Arbutus arizonica*, *A. xalapensis*, *Garrya longifolia* y *Crataegus mexicana*; dispersos entre los encinos se puede notar la presencia esporádica de algunos individuos aislados de *Pinus devoniana*, *P. leiophylla*, *P. pseudostrobus* y *P. teocote*. En las cañadas profundas y húmedas, en donde el suelo está más desarrollado, los árboles llegan a medir más de 10 m de altura, el bosque se torna más denso y sombrío y pueden encontrarse especies de ambientes mesófilos como: *Clethra hartwegii*, *Fraxinus uhdei*, *Prunus serotina* ssp. *capuli*, *Symplocos citrea*, *Ternstroemia lineata* ssp. *lineata*, *Tilia americana* var. *mexicana* y *Cornus excelsa*.

El estrato arbustivo mide de 2 a 5 m de alto y está formado por: *Garrya longifolia*, *Rhamnus hintonii*, *Baccharis conferta*, *B. multiflora*, *Stevia subpubescens*, *Bouvardia ternifolia*, *Ceanothus coeruleus*, *Acalypha lovelandii*, *Berberis moranensis*, *Bursera cuneata*, *Cedrela dugesii*, *Clusia salvinii*, *Indigofera thibaudiana*, *Senecio praecox*, *S. angulifolius*, *Verbesina greenmanii*, *Aralia humilis*, *Fuchsia fulgens*, *Erythrina coralloides*, *Monnina ciliolata*, *Cornus excelsa*, *Eupatorium mai-retianum*, *Montanoa grandiflora*, *Sedum oxypetalum*, *Forestiera phillyreoides*, entre otras.

El estrato herbáceo es muy diverso, entre las plantas frecuentes están: *Cirsium anartiolepis*, *Borreria verticillata*, *Sporobolus indicus*, *Senecio stoechadiformis*, *Muhlenbergia ciliata*, *Hyptis mutabilis*, *Guardiola mexicana*, *Commelina tuberosa*, *Gibasis linearis*, *Oxalis tetraphylla*, *Drymaria villosa*, *Bromus carinatus*, *Halenia brevicornis*, *Valeriana robertianifolia*, *V. pilosiuscula*, *V. sorbifolia*, *V. urticifolia*, *Diastatea micrantha*, *Piptochaetium virescens*, *Bidens odorata*, *B. bigelovii* var. *angustiloba*, *Pleopeltis polylepis*, *Cyperus aggregatus*, *C. seslerioides*, *C. spectabilis*, *Aphanostephus ramosissimus*, *Aegopogon tenellus*, *Polygala subalata*, *Arisaema macrospatum*, *Begonia balmisiana*, *B. gracilis*, *Bonplandia geminiflora*, *Echeandia mexicana*, *Isochilus bracteatus*, *Lopezia miniata*, *Panicum bulbosum*, *Psacalium megaphyllum*, *Salvia mexicana*, *S. thyrsoiflora*, *S. purpurea*, *S. lavanduloides*, *Spiranthes pyramidalis*, *Sprekelia formosissima*, *Tradescantia crassifolia*, *Trigonospermum annuum*, *Tripogandra disgrega*.

Las trepadoras comunes son: *Bomarea hirtella*, *Canavalia villosa*, *Clematis dioica*, *Iresine interrupta*, *Serjania triquetra*, *Dioscorea galeottiana*, *Cyclanthera ribiflora*, *Gonolobus uniflorus*, *Liabum discolor*, *Passiflora pavonis*, entre otras.

Asociación: Bosque de encino - Bosque tropical caducifolio. Esta comunidad se desarrolla en la parte oriental del pedregal, entre 2000 y 2120 m s.n.m., ocupa 10.11 km² que representan 32.61% del área de estudio, se desarrolla también sobre rocas basálticas y suelo delgado de tipo litosol.

Ocupa la zona más seca del pedregal, por lo que los componentes del bosque de encino están más espaciados y su tamaño es menor, se mezclan con elementos propios del bosque tropical caducifolio, con los que forma un mosaico complejo. El estrato arbóreo es bajo, de 3 a 6 m de alto, conformado por *Quercus rugosa*, que está acompañado por *Quercus castanea*, *Q. obtusata* y en menor proporción por *Arbutus arizonica*, *A. xalapensis*, *Prunus serotina* ssp. *capuli* y esporádicamente algunos individuos aislados de *Pinus devoniana* y *P. leiophylla*.

El arbustivo de 2 a 5 m de alto se encuentra bien representado por *Bursera cuneata*, *Cedrela dugesii*, *Myriocarpa brachystachys*, *Erythrina coralloides*, *Aralia humilis*, *Acacia angustissima*, *Cestrum lanatum*, *Euphorbia calyculata*, *Forestiera phillyreoides*, *Buddleja sessiliflora*, *Berberis moranensis*, *Clusia salvinii*, *Opuntia to-*

mentosa, *Sedum oxypetalum*, *S. griseum*, *Senecio praecox*, *Stevia salicifolia*, *Montanoa grandiflora*, *Senecio salignus*, *Brickellia squarrosa* y *Bouvardia ternifolia*.

El estrato herbáceo de 10 cm a 1 m está compuesto principalmente por *Aegopogon tenellus*, *Panicum bulbosum*, *Plumbago pulchella*, *Asclepias linaria*, *Calochortus fuscus*, *Cheilanthes bonariensis*, *Priva mexicana*, *Salvia longistyla*, *S. mexicana*, *S. purpurea*, *S. thyrsoiflora*, *S. lavanduloides*, *Tradescantia crassifolia*, *Loeselia mexicana*, *Cyperus seslerioides*, *Begonia gracilis*, *B. balmisiana*, *Piqueria trinervia* y *Peperomia campylotropa*.

Entre las epifitas se tiene a: *Encyclia venosa*, *Laelia autumnalis*, *Peperomia galioides*, *P. quadrifolia*, *Pleopeltis mexicana*, *P. polylepis*, *Stelis resupinata*, *Tillandsia dugesii*, *T. prodigiosa*, *T. recurvata* y *Viridantha lepidosepala*.

Las trepadoras son: *Bomarea hirtella*, *Canavalia villosa*, *Clematis dioica*, *Iresine interrupta*, *Serjania triquetra*, *Ipomoea dumetorum*, *I. cristulata*, *I. orizabensis*, *Gonolobus uniflorus*, *Dioscorea galeottiana*, *Cyclanthera tamnoides*, *Cologania broussonetii*, entre otras.

En los sitios en que la roca basáltica está desnuda, prácticamente sin suelo y expuestos a la insolación, los encinos desaparecen y se mantienen sólo los arbustos, formando un matorral bajo compuesto por *Senecio praecox*, *Euphorbia calyculata*, *Cedrela dugesii*, *Balmea stormae*, *Bursera cuneata* y *Erythrina coralloides*, acompañados de otras plantas de tallos carnosos como *Agave inaequidens*, *Altamiranoa mexicana*, *Echeveria fulgens*, *E. mucronata*, *Sedum dendroideum*, *S. oxypetalum*, *S. praealtum* y *Opuntia tomentosa*. Sin embargo las áreas que ocupa este matorral no tienen el tamaño suficiente para ser cartografiadas independientemente.

La presencia de elementos de afinidad tropical sobre la corriente de lava se debe en parte al microclima más seco generado por exposición de la roca basáltica que tiene la propiedad de absorber el calor de la radiación solar, por lo que la temperatura del suelo es más elevada que la del medio ambiente (Rzedowski, 1954).

Matorral secundario

Bajo esta denominación se considera a las comunidades que se caracterizan por estar constituidas por elementos arbustivos que se han desarrollado después de la destrucción de la vegetación natural formada por el bosque de encino-bosque tropical caducifolio y que están sometidas a perturbación constante. Actualmente ocupa la porción marginal del pedregal, principalmente en las inmediaciones de los asentamientos humanos. Se encuentra entre 2100 y 2160 m s.n.m.; estas áreas se mantienen permanentemente alteradas debido a que los pobladores de las comunidades recolectan plantas para diferentes usos, realizan la extracción de leña y madera y favorecen la presencia de ganado vacuno en ellas.

Es un matorral denso de 1 a 3(4) m de alto, dominado principalmente por *Senecio praecox*, *Euphorbia calyculata* y *Opuntia tomentosa*; otras especies presentes son *Cedrela dugesii*, *Bursera cuneata*, *Berberis moranensis*, *Montanoa grandiflora*, *Erythrina coralloides*, *Fuchsia fulgens*, *Crataegus mexicana*, *Agave inaequidens*, *Senecio salignus*, *Verbesina greenmanii*, *Eupatorium mairetianum*, *Buddleja cordata* ssp. *cordata*. Entre las herbáceas son comunes *Lopezia miniata*, *Bonplandia geminiflora* y *Loeselia mexicana*, y creciendo directamente sobre las rocas se encuentran a *Laelia autumnalis* y *Peperomia quadrifolia*.

En estas áreas se aprecia el crecimiento exuberante de las trepadoras *Cissus verticillata*, *Parthenocissus quinquefolia*, *Toxicodendron radicans* que en algunos sitios cubren completamente arbustos y árboles bajos haciendo muy difícil caminar entre ellos.

FLORA

Como resultado de las colectas botánicas, la revisión del herbario IEB y de la literatura, se obtuvo un total de 407 especies y 24 taxa infraespecíficos de plantas vasculares, las que se encuentran distribuidas en 262 géneros y 96 familias. La lista se presenta en el apéndice en tres columnas, la primera corresponde a las especies ordenadas por grandes grupos taxonómicos, familias y géneros en orden alfabético, la segunda señala la forma biológica de la planta y la tercera los usos registrados en la región.

De las especies registradas en el área de estudio, únicamente para 78(19.16%) se conoce con algún empleo en la región. Este conjunto vegetal se agrupa en 66 géneros (25.09%) y en 44 familias (46.87%) botánicas.

Se cotejó la lista de las especies obtenidas con la de especies de plantas bajo alguna categoría de riesgo de la norma oficial mexicana NOM-ECOL-059-2001 y se encontró que *Cedrela dugesii* ("nogalillo"), *Comarostaphylis discolor*, *Gentiana spathacea* y *Balmea stormae* ("palo blanco") están sujetos a protección especial, mientras que *Erythrina coralloides* ("colorín"), se considera amenazado.

Sinopsis numérica

Del total de especies de plantas vasculares colectadas en la zona de estudio las pteridofitas integran 7.12%, las gimnospermas constituyen 1.22% y las angiospermas 91.64%; dentro de este último grupo las monocotiledóneas con 69 especies representan 16.99% de la flora del área y las dicotiledóneas son el grupo mejor representado con 304 que equivalen a 74.63% (Cuadro 1).

Cuadro 1. Grupos taxonómicos de la flora del pedregal de Arócutin.

Grupos	Número de familias	Número de géneros	Número de especies	Unidades infraespecíficas
Pteridophyta	7	18	29	1
Gymnospermae	2	2	5	0
Angiospermae				
Monocotyledoneae	15	46	69	1
Dicotyledoneae	72	196	304	22
Total	96	262	407	24

El Cuadro 2 muestra las 10 familias mejor representadas por el número de géneros. Entre ellas reúnen 115 géneros, lo que representa 43.89% respecto al total de géneros de la flora.

Cuadro 2. Familias con mayor número de géneros de la flora del pedregal de Arócutin.

Familias	Número de géneros	% respecto al total de géneros de la flora
Compositae	38	14.50
Leguminosae	18	6.87
Gramineae	14	5.34
Orchidaceae	11	4.19
Pteridaceae	7	2.67
Caryophyllaceae	6	2.29
Malvaceae	6	2.29
Labiatae	5	1.90
Solanaceae	5	1.90
Rubiaceae	5	1.90
Total	115	43.89

El Cuadro 3 muestra las 10 familias mejor representadas por el número de especies. Se observa que contienen 190 especies, que corresponden a 46.68 % respecto al total de la flora.

Cuadro 3. Familias con mayor número de especies en la flora del pedregal de Arócutin.

Familias	Número de especies	% respecto al total de especies de la flora
Compositae	60	14.74
Leguminosae	27	6.63
Labiatae	19	4.66
Gramineae	18	4.42
Orchidaceae	15	3.68
Solanaceae	13	3.19
Pteridaceae	11	2.70
Euphorbiaceae	11	2.70
Commelinaceae	8	1.96
Polypodiaceae	8	1.96
Total	190	46.68

En la zona de estudio el género *Salvia* con 14 especies, es el mejor representado, ya que reúne 3.44% del total; *Euphorbia* con ocho integra 1.97%, *Solanum*, *Senecio* y *Peperomia* seis cada uno, juntos forman 4.42%, *Valeriana*, *Polypodium* y *Desmodium* con cinco forman en conjunto 3.68%; *Tillandsia*, *Sedum*, *Quercus*, *Pinus*, *Physalis*, *Cuphea*, *Muhlenbergia*, *Ipomoea*, *Eupatorium*, *Cheilanthes*, *Cyperus* y *Baccharis* con cuatro especies cada uno reúnen 11.79% y los 242 géneros restantes, con menos de cuatro especies forman 74.69%.

Aunque los encinos no son el grupo más diverso, dominan desde el punto de vista fisonómico y aportan la mayor parte de la biomasa y cobertura vegetal del pedregal.

La forma de vida mejor representada es la herbácea con 71.99%, le siguen los arbustos con 19.16%, los árboles con 6.88%, las hemiparásitas con 1% y las epifitas con el 0.98%.

Relación con la flora de la cuenca del lago de Pátzcuaro

Barrera-Bassols (1986) menciona que la zona que ocupa el pedregal, es una de las más conservadas dentro de la cuenca del Lago de Pátzcuaro, por ser una emanación lávica reciente, que al sufrir desmontes o quemas aisladas tiende a desarrollar con gran rapidez procesos de reconstitución, porque su potencial eco-

lógico no ha sido modificado. Por su parte Chávez-Carmona (1999) considera que es una de las reservas ecológicas más importantes de la cuenca, por contener la vegetación mejor preservada.

Al comparar la lista florística del pedregal con la de la cuenca del lago de Pátzcuaro publicada por Díaz-Barriga y Bello (1993) (Cuadro 4), se encontró que en esta área están representadas 38.76% de las especies, 53.68% de los géneros y 82.05% de las familias registradas para la cuenca en su totalidad.

Cuadro 4. Grupos taxonómicos de dos zonas a comparar.

	Cuenca del lago de Pátzcuaro (Díaz-Barriga y Bello, 1993)	Pedregal de Arócutin
Familias	117	96
Géneros	488	262
Especies	1050	407

A pesar del fuerte impacto que tienen las actividades humanas sobre la vegetación del pedregal, éste sigue siendo una de las zonas mejor preservadas de la cuenca del lago de Pátzcuaro. Además, dentro de la última, sólo en el pedregal de Arócutin crecen las siguientes 12 especies: *Arisaema macrospatum*, *Coreopsis petrophiloides*, *Dahlia neglecta*, *Isochilus bracteatus*, *Sedum oxypetalum*, *S. dendroideum*, *Aralia humilis*, *Metastelma angustifolium*, *Liabum aff. discolor*, *Salvia longistyla*, *Balmea stormae* y *Clusia salvinii*.

Tomando en cuenta que la cuenca del lago de Pátzcuaro tiene una superficie de 1000 km² (Barrera-Bassols, 1986) y que el pedregal ocupa sólo 31 km², que equivalen aproximadamente a 3.1% de la superficie total de la cuenca, resalta la importancia de esta pequeña área como un reservorio de especies.

AFINIDADES FLORÍSTICAS CON OTROS PEDREGALES DEL CINTURÓN VOLCÁNICO TRANSMEXICANO

Al analizar las relaciones florísticas que presentan los pedregales de Arócutin (Michoacán); Chichinautzin (Morelos); Huaniqueo (Michoacán) y San Ángel (Distrito Federal), utilizando el Índice de Similitud de Sørensen, se encontró que tanto a nivel genérico (70.22) como específico (46.89) la mayor relación del pedregal de Arócutin se da con el de Huaniqueo; siendo menor la similitud con los

pedregales de San Ángel (47.93/31.73) y Chichinautzin (46.89/26.71) (Cuadros 5 y 6).

Cuadro 5. Similitud de la flora de cuatro pedregales del Cinturón Volcánico Transmexicano a nivel de género, calculada con el Índice de Similitud de Sørensen.

Pedregal(es)	Arócutin	Chichinautzin	Huaniqueo	San Ángel
Arócutin		46.89	70.22	47.93
Chichinautzin	46.89		50.12	48.39
Huaniqueo	70.22	50.12		59.15
San Ángel	47.93	48.39	59.15	

Cuadro 6. Similitud de la flora de cuatro pedregales del Cinturón Volcánico Transmexicano a nivel de especie, calculada con el Índice de Similitud de Sørensen.

Pedregal(es)	Arócutin	Chichinautzin	Huaniqueo	San Ángel
Arócutin		26.71	46.69	31.73
Chichinautzin	26.71		17.12	20.31
Huaniqueo	46.69	17.12		32.41
San Ángel	31.73	20.31	32.41	

La mayor relación entre los pedregales de Arócutin y Huaniqueo es de esperarse ya que son los más cercanos, ambos se ubican en la misma región fisiográfica y la vegetación que los rodea es parecida. La principal diferencia entre los dos es el clima, ya que el de Arócutin se encuentra en un clima más fresco y húmedo que el de Huaniqueo y esto ocasiona que mientras que en el pedregal de Arócutin predominan los elementos del bosque de encino en el de Huaniqueo tienen mejor representación los del bosque tropical caducifolio (Cuadro 7).

Con relación a los pedregales de Chichinautzin y San Ángel, la relación a nivel genérico es positiva, mientras que al de especie es escasa. De nuevo la ubicación de los pedregales en el Cinturón Volcánico Transmexicano, dentro de la franja altitudinal por arriba de los 2000 m s.n.m., refleja la influencia franca de los elementos florísticos de los encinares y pinares y explica la similitud florística a nivel genérico. Los pedregales comparten un cierto número de especies propias de los bosques de pino y encino, como *Quercus rugosa*, *Q. castanea*, *Tillandsia*

Cuadro 7. Datos de los pedregales comparados. 1. Pedregal de Arócutin; 2. Pedregal de Chichinautzin (Espinosa, 1962); 3. Pedregales de Huaniqueo (Silva, 1996); 4. Pedregal de San Ángel (Rzedowski, 1954), esta lista se actualizó con los listados de Valiente-Banuet y de Luna (1990) y el de Castillo-Argüero et al. (2004).

Localidad	Superficie (km ²)	Altitud (m s.n.m.)	Climas	Tipos de vegetación	Años de antigüedad del derrame de lava
1	31	2060-2360	C(w ₂)(w)b(i')	Bosque de <i>Quercus</i> con algunas especies del bosque tropical caducifolio	Ca. 8430*
2	3	2000-2650	Cwbg	Bosque de pino, bosque de <i>Quercus</i> , matorral crasicaule y bosque tropical caducifolio	Pleistoceno
3	5	2000-2230	Cb(w ₁)(w)(i')g	Bosque tropical caducifolio, matorral xerófilo, bosque de <i>Quercus</i>	Ca. 2000
4	80	2250-3100	Cwbg	Bosque de pino, bosque de <i>Abies</i> , bosque de <i>Quercus</i> , bosque mesófilo de montaña y bosque tropical caducifolio	Ca. 2422±250

*Corona-Chávez et al. (2006).

recurvata, *Commelina tuberosa*, *Dahlia coccinea*, *Salvia mexicana*, *Peperomia galioides*, *Clematis dioica*, *Geranium seemannii*, además de algunas especies de ambientes xerofíticos de origen tropical como *Bursera cuneata*, *Asplenium praemorsum*, *Cheilanthes bonariensis*, *Ch. myriophylla*, *Pellaea cordifolia*, *P. ternifolia*, *Altamiranoa mexicana*, *Senecio praecox* y *Sedum oxypetalum*, este último endémico del Cinturón Volcánico Transmexicano (Pérez-Calix, 2004). Otras especies que comparten son las de amplia distribución geográfica, como: *Asclepias linaria*, *Bidens odorata*, *Senecio salignus*, *Brassica rapa*, *Oenothera pubescens*, *Phytolacca icosandra*, *Loeselia mexicana* y *Daucus montanus*.

Las diferencias tanto a nivel genérico como específico estarán dadas por factores locales, tales como orientación, topografía, clima y vegetación aledaña, e históricos como la edad y la extensión del pedregal (ver Cuadro 7).

CONCLUSIONES

El análisis de la información obtenida del inventario florístico muestra que el pedregal de Arócutin a pesar de su reducido tamaño concentra cerca de 40% de la flora de la cuenca de Pátzcuaro, por lo que representa un importante reservorio de la diversidad florística local. A pesar de la fuerte interacción que los habitantes de los poblados vecinos tienen con el mismo, la imposibilidad de realizar labores agrícolas y lo agreste del terreno han ayudado a que se mantenga como una de las zonas mejor preservadas de la cuenca del lago de Pátzcuaro. Por lo anterior se deben hacer las gestiones necesarias para proponer al pedregal como una reserva para la protección de la flora y fauna de la cuenca.

AGRADECIMIENTOS

Los autores deseamos manifestar nuestro más sincero agradecimiento al Dr. Jerzy Rzedowski Rotter por la amable asesoría del trabajo y la crítica del manuscrito final. Asimismo, al Dr. Emmanuel Pérez-Calix, por los comentarios y sugerencias hechas al trabajo.

La primera autora da las gracias al Instituto de Ecología A.C., Centro Regional del Bajío y a todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron a la culminación de esta aportación. Asimismo agradece la beca otorgada por esta Institución para la elaboración de la tesis, de febrero a diciembre de 2004.

LITERATURA CITADA

- Anónimo. 1978. Carta Geológica de Cherán, Michoacán (E14A21). Esc.1:50,000. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. México, D.F.
- Anónimo. 1982. Carta Edafológica de Cherán, Michoacán (E14A21). Esc.1:50,000. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. México, México, D.F.
- Anónimo. 2000a. Carta Topográfica de Cherán, Michoacán (E14A21). Esc.1:50,000. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. México, D.F.
- Anónimo. 2000b. Relación de Michoacán. El Colegio de Michoacán y el Gobierno del Estado de Michoacán. Morelia, Michoacán. 832 pp.

- Anónimo. 2003. Ajuno. Centro de Estudios Ecológicos y Sociales, A.C. Pátzcuaro, Michoacán. 23 pp.
- Barrera-Bassols, N. 1986. La cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán; aproximación al análisis de una región natural. Tesis de licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. 392 pp.
- Brady, N. y R. Weil. 1999. The nature and properties of soils, 20th. Prentice-Hall, Inc. New Jersey. pp. 82-92.
- Caballero, J., N. Barrera-Bassols y C. Mapes. 1986. Mapa de vegetación de la cuenca del Lago de Pátzcuaro. Escala: 1:50,000. Instituto de Biología-Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. (inédito).
- Castillo-Argüero, S., G. Montes-Cartas, M. A. Romero-Romero, Y. Martínez-Orea, P. Guadarrama-Chávez, I. Sánchez-Gallén y O. Núñez-Castillo. 2004. Dinámica y conservación de la flora del matorral xerófilo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (D.F., México). Bol. Soc. Bot. Méx. 74: 51-75.
- Chávez-Carmona, A. 1999. Flora de dos pedregales de la cuenca del Lago de Pátzcuaro: Arócutin y Sur de Pátzcuaro. Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, A.C. Pátzcuaro, Michoacán. s/n de pp.
- Corona-Chávez, P., M. Reyes-Salas, V. H. Garduño, I. Israde, R. Lozano y O. Morton. 2006. Asimilación de xenolitos graníticos en el Campo Volcánico Michoacán-Guanajuato: el caso de Arócutin Michoacán, México. Rev. Mex. Cien. Geol. 23: 233-245.
- Díaz-Barriga, H. y M. A. Bello. 1993. Contribución al conocimiento de la flora de la cuenca del Lago de Pátzcuaro. Libro técnico No. 1. Centro de Investigación Pacífico Centro- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Uruapan, Michoacán. pp. 63-70.
- Espinosa, J. 1962. Vegetación de una corriente de lava de formación reciente localizada en el declive meridional de la Sierra de Chichinautzin. Bol. Soc. Bot. Méx. 27: 67-126.
- García, E. 1973. Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. 246 pp.
- Garduño, V. H. 1999a. Marco tectónico del estado de Michoacán. Carta Geológica de Michoacán. Departamento de Geología del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán. pp. 1-9.
- Garduño, V. H. 1999b. El vulcanismo del Mioceno-Pliocuaternario de Michoacán. Carta Geológica de Michoacán. Departamento de Geología del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán. pp. 27-45.

- Garduño, V. H., I. Israde y E. Arreygue. 2002. La inquietante evolución de las cuencas lacustres en zonas volcánicas: ejemplo, la cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, México. Aportes al Proyecto Pátzcuaro. Estudios, propuestas y avances para la restauración de la cuenca del Lago de Pátzcuaro. Instituto de Investigaciones Metalúrgicas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Morelia, Michoacán. pp. 25-67.
- Guevara-Féfer, F., J. Rzedowski y S. Zamudio. 1981. Excursión a la Tierra Caliente de Michoacán (Morelia-Pátzcuaro, Arroyo de Rosales-Presa Zicuirán). Guías botánicas de excursiones en México. V Congreso Mexicano de Botánica. Escuela de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán. pp. 87-88.
- Gutiérrez, Ma. del C., C. A. Ortiz y P. Sánchez. 2003. Edafología general. Especialidad de Edafología. Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, Instituto de Recursos Naturales. Montecillo, Texcoco. Estado de México. 84 pp.
- Lot, A. y F. Chiang. 1986. Manual de herbario. Administración y manejo de colecciones, técnicas de recolección y preparación de ejemplares botánicos. Consejo Nacional de la Flora de México. México, D.F. 142 pp.
- Pérez, E. y V. Soto. 2008. Ordenamiento territorial comunitario del Ejido de San Francisco Uricho, municipio de Erongarícuaro, Michoacán. Proyecto hecho por: Comisión Nacional Forestal, Programa Árbol, y Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales, A.C. 54 pp.
- Pérez-Calix, E. 2004. La familia Crassulaceae en el Bajío y Regiones Adyacentes. Tesis de doctorado. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. 199 pp.
- Rzedowski, J. 1954. Vegetación del Pedregal de San Ángel, Distrito Federal, México. Anales Esc. Nac. Cienc. Biol. Méx. 8: 59-129.
- Rzedowski, J. 1978. Vegetación de México. Limusa. México, D.F. 429 pp.
- Silva, P. 1996. Inventario de la flora vascular y de plantas útiles de los pedregales del municipio de Huaniqueo, Michoacán. México. Tesis de licenciatura. Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán. 138 pp.
- Valiente-Banuet, A. y E. de Luna. 1990. Una lista florística actualizada para la reserva del Pedregal de San Ángel. México, D.F. Acta Bot. Mex. 9: 13-30.

APÉNDICE

Inventario florístico del pedregal de Arócutin, municipio de Erongarícuaro, Michoacán.

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
PTERIDOPHYTA		
SELAGINELLACEAE		
<i>Selaginella pallescens</i> (C. Presl) Spring	hierba	medicinal
ATHYRIACEAE		
<i>Woodsia mollis</i> (Kaulf.) J. Smith	hierba	
ASPLENIACEAE		
<i>Asplenium hallbergii</i> Mickel & Beitel	hierba	
<i>Asplenium monanthes</i> L.	hierba	
<i>Asplenium praemorsum</i> Sw.	hierba	
DRYOPTERIDACEAE		
<i>Dryopteris rossii</i> C. Chr.	hierba	
<i>Elaphoglossum petiolatum</i> (Sw.) Urb.	hierba	
<i>Nephrolepis undulata</i> (P. Afzel. ex Sw.) J. Smith	hierba	
OPHIOGLOSSACEAE		
<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	hierba	
<i>Ophioglossum engelmannii</i> Prantl	hierba	
POLYPODIACEAE		
<i>Phlebodium areolatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Smith	hierba	
<i>Pleopeltis mexicana</i> (Fée) Mickel & Beitel	hierba	
<i>Pleopeltis polylepis</i> (Roem. ex Kunze) T. Moore	hierba epífita	medicinal
<i>Polypodium furfuraceum</i> Schldl. & Cham.	hierba	
<i>Polypodium longepinnulatum</i> Fourn.	hierba	
<i>Polypodium madreense</i> J. Smith	hierba	
<i>Polypodium plesiosorum</i> Kunze	hierba	medicinal

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
<i>Polypodium thyssanolepis</i> A. Braun ex Klotzsch	hierba	
PTERIDACEAE		
<i>Adiantum andicola</i> Liebm.	hierba	
<i>Argyrochosma incana</i> (C. Presl) Windham	hierba	
<i>Astrolepis laevis</i> (M. Martens & Galeotti) Mickel	hierba	
<i>Cheilanthes bonariensis</i> (Willd.) Proctor	hierba	
<i>Cheilanthes farinosa</i> (Forssk.) Kaulf.	hierba	
<i>Cheilanthes marginata</i> H.B.K.	hierba	
<i>Cheilanthes myriophylla</i> Desv.	hierba	
<i>Mildella fallax</i> (M. Martens & Galeotti) G. L. Nesom	hierba	
<i>Pellaea cordifolia</i> (Sessé & Moc.) A. R. Smith	hierba	
<i>Pellaea ternifolia</i> (Cav.) Link	hierba	
<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>feeii</i> (Schaffner ex Fée) Maxon ex Yuncker	hierba	
GYMNOSPERMAE		
CUPRESSACEAE		
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	árbol	medicinal
PINACEAE		
<i>Pinus devoniana</i> Lindl.	árbol	
<i>Pinus leiophylla</i> Schltdl. & Cham.	árbol	
<i>Pinus pseudostrobus</i> Lindl.	árbol	
<i>Pinus teocote</i> Schltdl. & Cham.	árbol	medicinal
ANGIOSPERMAE		
DICOTYLEDONEAE		

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
AMARANTHACEAE		
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	hierba	
<i>Gomphrena serrata</i> L.	hierba	
<i>Guilleminea densa</i> (Willd.) Moq.	hierba rastrera	medicinal
<i>Iresine diffusa</i> Humb. & Bonpl.	hierba	
<i>Iresine interrupta</i> Benth.	arbusto	
<i>Iresine</i> sp.	arbusto ascendente	
ANACARDIACEAE		
<i>Rhus aromatica</i> var. <i>schmidelioides</i> (Schltdl.) Engl.	arbusto	
<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze	arbusto ascendente	tóxica
ANNONACEAE		
<i>Annona cherimola</i> Mill.	árbol	
APOCYNACEAE		
<i>Mandevilla syrinx</i> Woods.	hierba ascendente	
ARALIACEAE		
<i>Aralia humilis</i> Cav.	arbusto	artesanal
ASCLEPIADACEAE		
<i>Asclepias linaria</i> Cav.	hierba	medicinal
<i>Asclepias ovata</i> M. Martens & Galeotti	hierba	
<i>Funastrum elegans</i> (Decne.) Schltr.	hierba trepadora	
<i>Gonolobus uniflorus</i> H.B.K.	hierba trepadora	
<i>Metastelma angustifolium</i> Turcz.	hierba trepadora	
BEGONIACEAE		
<i>Begonia balmisiana</i> Balmis	hierba	
<i>Begonia gracilis</i> H.B.K.	hierba	
BERBERIDACEAE		
<i>Berberis moranensis</i> Schult. & Schult. f.	arbusto	comestible

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
BIGNONIACEAE		
<i>Tecoma stans</i> (L.) H.B.K.	arbusto	medicinal
BORAGINACEAE		
<i>Ehretia latifolia</i> DC.	árbol	
<i>Lithospermum distichum</i> Ortega	hierba	
BUDDLEJACEAE		
<i>Buddleja cordata</i> H.B.K. ssp. <i>cordata</i>	árbol	medicinal
<i>Buddleja sessiliflora</i> H.B.K.	arbusto	medicinal
BURSERACEAE		
<i>Bursera cuneata</i> (Schltdl.) Engl.	árbol	artesanal, combustible y ceremonial
CACTACEAE		
<i>Opuntia tomentosa</i> Salm-Dyck	arbusto	medicinal
CAMPANULACEAE		
<i>Diastatea micrantha</i> (H.B.K.) McVaugh	hierba	
<i>Lobelia fenestralis</i> Cav.	hierba	
<i>Lobelia laxiflora</i> H.B.K.	hierba	
CARYOPHYLLACEAE		
<i>Arenaria lanuginosa</i> (Michx.) Rohrb.	hierba	
<i>Cerastium nutans</i> Raf.	hierba	
<i>Corrigiola andina</i> Triana & Planch.	hierba	
<i>Drymaria glandulosa</i> Bartl.	hierba	
<i>Drymaria villosa</i> Cham. & Schltdl.	hierba	
<i>Minuartia moehringioides</i> (Moc. & Sessé ex DC.) Mattf.	hierba	
<i>Stellaria cuspidata</i> Willd.	hierba	
CELASTRACEAE		
<i>Celastrus pringlei</i> Rose	arbusto ascendente	

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
CISTACEAE		
<i>Helianthemum glomeratum</i> (Lag.) Lag. ex Dunal	hierba	medicinal
<i>Lechea tripetala</i> (Moc. & Sessé) Britton	hierba	
CLETHRACEAE		
<i>Clethra hartwegii</i> Britton	árbol	
CLUSIACEAE		
<i>Clusia salvinii</i> D. J. Sm.	arbusto	medicinal
<i>Hypericum silenoides</i> Juss.	hierba	
COMPOSITAE		
<i>Acourtia humboldtii</i> var. <i>adnata</i> L. Cabrera	hierba	
<i>Ageratum corymbosum</i> Zucc. ex Pers.	hierba	
<i>Aphanostephus ramosissimus</i> DC.	hierba	medicinal
<i>Archibaccharis serratifolia</i> (H.B.K.) Blake	hierba	
<i>Aster moranensis</i> H.B.K.	hierba	
<i>Astranthium orthopodum</i> (Rob. & Fern.) Larsen	hierba	
<i>Baccharis conferta</i> H.B.K.	arbusto	medicinal
<i>Baccharis multiflora</i> var. <i>brevipappa</i> Mc Vaugh	arbusto	
<i>Baccharis serraefolia</i> DC.	arbusto	
<i>Baccharis thesioides</i> H.B.K.	arbusto	medicinal
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	arbusto	
<i>Bidens bigelovii</i> var. <i>angustiloba</i> (DC.) Ballard	hierba	
<i>Bidens odorata</i> Cav.	hierba	medicinal
<i>Brickellia squarrosa</i> var. <i>oligadena</i> B. L. Rob.	arbusto	
<i>Cirsium anartiolepis</i> Petr.	hierba	medicinal
<i>Cirsium raphilepis</i> (Hemsl.) Petr.	hierba	medicinal
<i>Coreopsis petrophiloides</i> B. L. Rob. & Greenm.	arbusto	

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
<i>Cosmos crithmifolius</i> H.B.K.	hierba	
<i>Dahlia coccinea</i> Cav.	hierba	
<i>Dahlia neglecta</i> Saar	hierba	
<i>Erigeron scaberrimus</i> (Less.) Nesom	hierba	
<i>Erigeron velutipes</i> Hook. & Arn.	hierba	
<i>Eupatorium adenophorum</i> Spreng.	arbusto	
<i>Eupatorium mairetianum</i> DC.	arbusto	
<i>Eupatorium petiolare</i> Moc. ex DC.	arbusto	
<i>Eupatorium pycnocephalum</i> Less.	hierba	
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruíz & Pavón	hierba	
<i>Gnaphalium canescens</i> DC.	hierba	medicinal
<i>Gnaphalium oxyphyllum</i> DC.	hierba	
<i>Guardiola mexicana</i> Humb. & Bonpl.	arbusto	
<i>Hieracium pringlei</i> A. Gray	hierba	
<i>Jaegeria hirta</i> (Lag.) Less.	hierba	
<i>Liabum</i> aff. <i>discolor</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl.	arbusto ascendente	
<i>Montanoa grandiflora</i> DC.	arbusto	medicinal
<i>Pectis prostrata</i> Cav.	hierba	
<i>Perymenium globosum</i> B.L. Rob.	hierba	
<i>Perymenium reticulatum</i> J. J. Fay	hierba	
<i>Pinaropappus roseus</i> (Less.) Less. var. <i>roseus</i>	hierba	
<i>Piqueria trinervia</i> Cav.	hierba	medicinal
<i>Psacalium megaphyllum</i> (B. L. Rob. & Greenm.) Rydb.	hierba	
<i>Rumfordia floribunda</i> DC.	arbusto	
<i>Schkuhria pinnata</i> var. <i>virgata</i> (La Llave) Heiser	hierba	
<i>Senecio angulifolius</i> DC.	arbusto	
<i>Senecio mexicanus</i> McVaugh	arbusto	

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
<i>Senecio praecox</i> (Cav.) DC.	arbusto	
<i>Senecio salignus</i> DC.	arbusto	medicinal
<i>Senecio sessilifolius</i> (Hook. & Arn.) Hemsl.	hierba	
<i>Senecio stoechadiformis</i> DC.	hierba	medicinal
<i>Stevia nepetifolia</i> H.B.K.	hierba	
<i>Stevia salicifolia</i> Cav.	arbusto	medicinal
<i>Stevia subpubescens</i> Lag.	arbusto	
<i>Tagetes filifolia</i> Lag.	hierba	medicinal y comestible
<i>Tagetes lucida</i> Cav.	hierba	medicinal
<i>Tagetes lunulata</i> Ortega	hierba	medicinal
<i>Tithonia tubaeformis</i> (Jacq.) Cass.	hierba	
<i>Trigonospermum annuum</i> McVaugh & Lask.	hierba	
<i>Verbesina greenmanii</i> Urb.	arbusto	medicinal
<i>Vernonia alamanii</i> DC.	arbusto	
<i>Viguiera hemsleyana</i> Blake	hierba	medicinal
<i>Zexmenia palmeri</i> Greenm.	hierba	
CONVOLVULACEAE		
<i>Dichondra argentea</i> Humb. & Bonpl.	hierba rastrera	
<i>Evolvulus alsinoides</i> L.	hierba	
<i>Ipomoea cristulata</i> Hall	hierba trepadora	
<i>Ipomoea dumetorum</i> Willd.	hierba trepadora	
<i>Ipomoea orizabensis</i> (Pelletan) Ledeb. ex Steud.	hierba rastrera	medicinal
<i>Ipomoea plummerae</i> A. Gray	hierba rastrera	
CORNACEAE		
<i>Cornus excelsa</i> H.B.K.	árbol	
CRASSULACEAE		
<i>Altamiranoa mexicana</i> (Schltdl.) Rose	hierba	
<i>Echeveria fulgens</i> Lem.	hierba	

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
<i>Echeveria mucronata</i> (Baker) Schltld.	hierba	
<i>Sedum dendroideum</i> Moc. & Sessé ex DC.	arbusto	medicinal
<i>Sedum griseum</i> Praeger	arbusto	
<i>Sedum oxypetalum</i> H.B.K.	arbusto	medicinal
<i>Sedum praealtum</i> DC.	arbusto	
CRUCIFERAE		
<i>Brassica rapa</i> L.	hierba	
<i>Pennellia longifolia</i> (Benth.) Rollins	hierba	
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	hierba	
<i>Raphanus</i> sp.	hierba	
CUCURBITACEAE		
<i>Cyclanthera ribiflora</i> (Schltld.) Cogn.	hierba trepadora	
<i>Cyclanthera tamnoides</i> (Willd.) Cogn.	hierba trepadora	
<i>Sicyos deppei</i> G. Don	hierba trepadora	
CHENOPODIACEAE		
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	hierba	medicinal
<i>Chenopodium graveolens</i> Willd.	hierba	
ERICACEAE		
<i>Arbutus arizonica</i> (A. Gray) Sarg.	árbol	medicinal
<i>Arbutus xalapensis</i> H.B.K.	árbol	medicinal
<i>Comarostaphylis discolor</i> (Hook.) Diggs	arbusto	
EUPHORBIACEAE		
<i>Acalypha lovelandii</i> (McVaugh) McVaugh	arbusto	medicinal
<i>Acalypha mollis</i> H.B.K.	arbusto	
<i>Croton adspersus</i> Benth.	arbusto	medicinal
<i>Euphorbia calyculata</i> H.B.K.	arbusto	medicinal
<i>Euphorbia densiflora</i> (Klotzsch & Garcke) Klotzsch	hierba rastrera	
<i>Euphorbia furcillata</i> H.B.K.	hierba	
<i>Euphorbia graminea</i> Jacq.	hierba	

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
<i>Euphorbia macropus</i> (Klotzsch & Garcke) Boiss.	hierba	
<i>Euphorbia ocymoidea</i> L.	hierba	
<i>Euphorbia schiedeana</i> (Klotzsch & Garcke) Mayfield, ined.	hierba	
<i>Euphorbia subreniformis</i> S. Watson	hierba	
FAGACEAE		
<i>Quercus castanea</i> Née	árbol	medicinal y combustible
<i>Quercus laeta</i> Liebm.	árbol	
<i>Quercus obtusata</i> Humb. & Bonpl.	árbol	
<i>Quercus rugosa</i> Née	árbol	medicinal y combustible
FLACOURTIACEAE		
<i>Xylosma flexuosum</i> (H.B.K.) Hemsl.	arbusto	
GARRYACEAE		
<i>Garrya longifolia</i> Rose	árbol	medicinal
GENTIANACEAE		
<i>Gentiana spathacea</i> H.B.K.	hierba	
<i>Halenia brevicornis</i> (H.B.K.) G. Don	hierba	
GERANIACEAE		
<i>Geranium hernandesii</i> DC.	hierba	
<i>Geranium seemannii</i> Peyr.	hierba	
HYDROPHYLLACEAE		
<i>Nama dichotomum</i> (Ruiz & Pavon) Choisy var. <i>dichotomum</i>	hierba	
<i>Phacelia platycarpa</i> (Cav.) Spreng.	hierba	
LABIATAE		
<i>Hyptis mutabilis</i> (Rich.) Briq.	arbusto	medicinal
<i>Lepechinia caulescens</i> (Ortega) Epling	hierba	
<i>Marrubium vulgare</i> L.	hierba	medicinal

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
<i>Salvia clinopodioides</i> H.B.K.	hierba	
<i>Salvia dichlamys</i> Epling	hierba	
<i>Salvia hispanica</i> L.	hierba	
<i>Salvia iodantha</i> Fern.	hierba	
<i>Salvia laevis</i> Benth.	hierba	
<i>Salvia lavanduloides</i> Benth.	hierba	medicinal
<i>Salvia longispicata</i> M. Martens & Galeotti	hierba	
<i>Salvia longistyla</i> Benth.	hierba	
<i>Salvia mexicana</i> L.	hierba	medicinal
<i>Salvia mexicana</i> var. <i>minor</i> Benth.	hierba	
<i>Salvia microphylla</i> H.B.K.	hierba	medicinal
<i>Salvia polystachya</i> Ortega	arbusto	medicinal
<i>Salvia purpurea</i> Cav.	hierba	
<i>Salvia thyrsoflora</i> Benth.	hierba	
<i>Salvia tiliifolia</i> Vahl	hierba	
<i>Stachys coccinea</i> Jacq.	hierba	
<i>Stachys parvifolia</i> M. Martens & Galeotti	hierba	
LEGUMINOSAE		
<i>Acaciella angustissima</i> (Mill.) Kuntze var. <i>angustissima</i>	arbusto	
<i>Aeschynomene villosa</i> Poir.	hierba	
<i>Astragalus guatemalensis</i> var. <i>brevidentatus</i> (Hemsl.) Barneby	hierba	
<i>Calliandra grandiflora</i> (L'Hér.) Benth.	arbusto	medicinal
<i>Canavalia villosa</i> Benth.	arbusto trepador	
<i>Cologania broussonetii</i> (Balb.) DC.	hierba trepadora	
<i>Cologania grandiflora</i> Rose	hierba postrada	
<i>Crotalaria pumila</i> Ortega	hierba	
<i>Crotalaria rotundifolia</i> var. <i>vulgaris</i> Windler	hierba postrada	
<i>Dalea sericea</i> Lag.	hierba	

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
<i>Dalea versicolor</i> var. <i>involuta</i> (Rydb.) Barneby	hierba	
<i>Desmodium aparines</i> (Link) DC.	hierba	
<i>Desmodium bellum</i> (Blake) Schub.	arbusto	
<i>Desmodium jaliscanum</i> S. Watson	arbusto	
<i>Desmodium neomexicanum</i> A. Gray	hierba	
<i>Desmodium uncinatum</i> (Jacq.) DC.	hierba	
<i>Erythrina coralloides</i> DC.	árbol	medicinal
<i>Indigofera thibaudiana</i> DC.	arbusto	
<i>Lupinus elegans</i> H.B.K.	arbusto	
<i>Macroptilium gibbosifolium</i> (J. G. Ortega) A. Delgado	hierba	
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	hierba trepadora	
<i>Phaseolus leptostachyus</i> Benth.	hierba trepadora	
<i>Phaseolus pluriflorus</i> Maréchal, Mascherpa & Stainier	hierba trepadora	
<i>Prosopis laevigata</i> (Willd.) M. C. Johnst.	árbol	
<i>Rhynchosia discolor</i> M. Martens & Galeotti	hierba trepadora	
<i>Trifolium amabile</i> H.B.K.	hierba	
<i>Zornia reticulata</i> Smith	hierba	
LENTIBULARIACEAE		
<i>Pinguicula oblongiloba</i> DC.	hierba	
LOASACEAE		
<i>Mentzelia hispida</i> Willd.	hierba	
LORANTHACEAE		
<i>Cladocolea grahamii</i> (Benth.) Tiegh.	hemiparásita	
<i>Phoradendron brachystachyum</i> (DC.) Nutt.	hemiparásita	
<i>Phoradendron velutinum</i> (DC.) Nutt.	hemiparásita	
<i>Psittacanthus calyculatus</i> (DC.) Don	hemiparásita	
LYTHRACEAE		
<i>Cuphea aequipetala</i> Cav.	hierba	medicinal

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
<i>Cuphea jorullensis</i> H.B.K.	hierba	
<i>Cuphea toluicana</i> Peyr.	hierba	
<i>Cuphea wrightii</i> A. Gray var. <i>wrightii</i>	hierba	
MALPIGHIACEAE		
<i>Gaudichaudia cynanchoides</i> H.B.K.	hierba trepadora	
MALVACEAE		
<i>Anoda cristata</i> (L.) Schlttdl.	hierba	
<i>Kearnemalvastrum subtriflorum</i> (Lag.) Bates	arbusto	
<i>Malva parviflora</i> L.	hierba	medicinal
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	arbusto	
<i>Periptera punicea</i> (Lag.) DC.	hierba	
<i>Sida haenkeana</i> C. Presl	hierba	medicinal
MELIACEAE		
<i>Cedrela dugesii</i> S. Watson	arbusto-árbol	artesanal
NYCTAGINACEAE		
<i>Mirabilis longiflora</i> L.	hierba	
OLEACEAE		
<i>Forestiera phillyreoides</i> (Benth.) Torr.	arbusto	
<i>Fraxinus uhdei</i> (Wenz.) Lingelsh.	árbol	medicinal
ONAGRACEAE		
<i>Fuchsia fulgens</i> DC.	arbusto	
<i>Fuchsia parviflora</i> Lindl.	arbusto	
<i>Gaura hexandra</i> Ortega	hierba	
<i>Lopezia miniata</i> Lag. ex DC.	hierba	medicinal
<i>Oenothera deserticola</i> (Loes.) Munz	hierba	
<i>Oenothera pubescens</i> Willd. ex Spreng.	hierba	
<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	hierba	medicinal
OROBANCHACEAE		
<i>Conopholis alpina</i> Liebm.	hierba parásita de raíces	

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
OXALIDACEAE		
<i>Oxalis hernandesii</i> DC.	hierba	
<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.	hierba	
PASSIFLORACEAE		
<i>Passiflora pavonis</i> Mast.	hierba trepadora	
PHYTOLACCACEAE		
<i>Phytolacca icosandra</i> L.	hierba	
PIPERACEAE		
<i>Peperomia campyloptropa</i> Hill	hierba	
<i>Peperomia galioides</i> H.B.K.	hierba	
<i>Peperomia quadrifolia</i> (L.) H.B.K.	hierba	
<i>Peperomia reflexa</i> (L.) A. Dietr.	hierba	
<i>Peperomia tetraphylla</i> Hook. & Arn.	hierba	
<i>Peperomia</i> sp.	hierba	
PLANTAGINACEAE		
<i>Plantago australis</i> ssp. <i>hirtella</i> (H.B.K.) Rahn	hierba	medicinal
<i>Plantago major</i> L.	hierba	
PLUMBAGINACEAE		
<i>Plumbago pulchella</i> Boiss.	arbusto	
POLEMONIACEAE		
<i>Bonplandia geminiflora</i> Cav.	hierba	
<i>Loeselia glandulosa</i> (Cav.) G. Don	hierba	
<i>Loeselia mexicana</i> (Lam.) Brand	arbusto	medicinal
POLYGALACEAE		
<i>Monnina ciliolata</i> DC.	arbusto	
<i>Monnina wrightii</i> A. Gray	hierba	
<i>Polygala conferta</i> Benn.	hierba	
<i>Polygala rivinifolia</i> H.B.K.	hierba	
<i>Polygala subalata</i> S. Watson	hierba	

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
POLYGONACEAE		
<i>Rumex crispus</i> L.	hierba	medicinal
RANUNCULACEAE		
<i>Clematis dioica</i> L.	arbusto ascendente	
<i>Ranunculus petiolaris</i> H.B.K.	hierba	
<i>Ranunculus petiolaris</i> H.B.K. var. <i>petiolaris</i>	hierba	
RHAMNACEAE		
<i>Ceanothus coeruleus</i> Lag.	arbusto	
<i>Rhamnus</i> aff. <i>hintonii</i> M. C. Johnst. & L. A. Johnst.	árbol	
ROSACEAE		
<i>Crataegus mexicana</i> Moc. & Sessé ex DC.	árbol	medicinal y comestible
<i>Prunus serotina</i> ssp. <i>capuli</i> (Cav.) McVaugh	árbol	comestible
<i>Rubus adenotrichos</i> Schltldl.	hierba trepadora	
RUBIACEAE		
<i>Balmea stormae</i> Martínez	arbusto	artesanal
<i>Borreria verticillata</i> (L.) G. Mey.	hierba	
<i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schltldl.	arbusto	
<i>Crusea longiflora</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Anderson	hierba	
<i>Crusea megalocarpa</i> (A. Gray) S. Watson	hierba	
<i>Galium uncinatum</i> DC.	hierba ascendente	
SAPINDACEAE		
<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	arbusto	
<i>Serjania triquetra</i> Radlk.	arbusto trepador	
SCROPHULARIACEAE		
<i>Bacopa procumbens</i> (Mill.) Greenm.	hierba	
<i>Castilleja arvensis</i> Cham. & Schltldl.	hierba	medicinal

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
<i>Castilleja lithospermoides</i> H.B.K.	hierba	
<i>Castilleja tenuiflora</i> Benth.	hierba	
<i>Veronica persica</i> Poir.	hierba rastrera	
SOLANACEAE		
<i>Cestrum lanatum</i> M. Martens & Galeotti	arbusto	
<i>Lycianthes pringlei</i> (Rob. & Greenm.) Bitter	arbusto	
<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	hierba	
<i>Physalis chenopodiifolia</i> Lam.	hierba	
<i>Physalis nicandroides</i> Schltld.	hierba	
<i>Physalis sordida</i> Fernald	hierba	
<i>Physalis volubilis</i> Waterf.	hierba	
<i>Solanum lanceifolium</i> Jacq.	arbusto	
<i>Solanum lanceolatum</i> Cav.	arbusto	
<i>Solanum nigrescens</i> M. Martens & Galeotti	hierba	medicinal
<i>Solanum stoloniferum</i> Schltld.	hierba	
<i>Solanum umbellatum</i> Mill.	arbusto	
<i>Solanum verrucosum</i> Schltld.	hierba	
SYMPLOCACEAE		
<i>Symplocos citrea</i> Lex.	árbol	
THEACEAE		
<i>Ternstroemia lineata</i> DC. ssp. <i>lineata</i>	árbol	
TILIACEAE		
<i>Tilia americana</i> var. <i>mexicana</i> (Schltld.) Hardin	árbol	medicinal
UMBELLIFERAE		
<i>Daucus montanus</i> Humb. & Bonpl. ex Spreng.	hierba	
<i>Eryngium carlinae</i> F. Delaroché	hierba	medicinal
<i>Prionosciadium thapsoides</i> (DC.) Mathsson	hierba	
URTICACEAE		
<i>Myriocarpa brachystachys</i> S. Watson	árbol	

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
<i>Parietaria pensylvanica</i> Muhl.	hierba	
<i>Urtica subincisa</i> Benth.	hierba	medicinal
VALERIANACEAE		
<i>Valeriana palmeri</i> A. Gray	hierba	
<i>Valeriana pilosiuscula</i> M. Martens & Galeotti	hierba	
<i>Valeriana robertianifolia</i> Briq.	hierba	
<i>Valeriana sorbifolia</i> H.B.K.	hierba	
<i>Valeriana urticifolia</i> var. <i>scorpioides</i> (DC.) Barrie	hierba	
VERBENACEAE		
<i>Bouchea prismatica</i> var. <i>brevirostra</i> Grenz.	hierba	medicinal
<i>Glandularia teucrifolia</i> (M. Martens & Galeotti) Umber	hierba rastrera	
<i>Priva mexicana</i> (L.) Pers.	hierba	
<i>Verbena menthaefolia</i> Benth.	hierba	medicinal
VIOLACEAE		
<i>Hybanthus verbenaceus</i> (H.B.K.) Loes.	hierba	
<i>Viola grahamii</i> Benth.	hierba	
VITACEAE		
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C. E. Jarvis	arbusto trepador	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	arbusto trepador	
<i>Vitis tiliifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.	arbusto trepador	comestible
MONOCOTYLEDONEAE		
AGAVACEAE		
<i>Agave inaequidens</i> C. Koch	arbusto	medicinal
<i>Agave salmiana</i> Otto ex Salm. var. <i>salmiana</i>	arbusto	
<i>Prochnyanthes mexicana</i> (Zucc.) Rose	hierba	

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
ALSTROEMERIACEAE		
<i>Bomarea hirtella</i> (H.B.K.) Herb.	hierba ascendente	comestible
ALLIACEAE		
<i>Allium glandulosum</i> Link & Otto	hierba	
AMARYLLIDACEAE		
<i>Sprekelia formosissima</i> (L.) Herb.	hierba	
<i>Zephyranthes fosteri</i> Traub.	hierba	
ANTHERICACEAE		
<i>Echeandia mexicana</i> Cruden	hierba	
ARACEAE		
<i>Arisaema macrospathum</i> Benth.	hierba	
BROMELIACEAE		
<i>Tillandsia dugesii</i> Baker	hierba epífita	
<i>Tillandsia juncea</i> (Ruíz & Pavón) Poir.	hierba epífita	
<i>Tillandsia prodigiosa</i> (Lem.) Baker	hierba epífita	
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	hierba epífita	
<i>Viridantha atroviridipetala</i> (Matuda) Espejo	hierba epífita	
<i>Viridantha lepidosepala</i> (L.B. Sm.) Espejo	hierba epífita	
CALOCHORTACEAE		
<i>Calochortus fuscus</i> Schult. f.	hierba	
COMMELINACEAE		
<i>Commelina leiocarpa</i> Benth.	hierba ascendente	
<i>Commelina pallida</i> Willd.	hierba	
<i>Commelina tuberosa</i> L.	hierba	
<i>Gibasis linearis</i> (Benth.) Rohweder	hierba	
<i>Gibasis pellucida</i> (M. Martens & Galeotti) D. R. Hunt	hierba	
<i>Tradescantia crassifolia</i> Cav.	hierba	
<i>Tripogandra amplexans</i> Handlos	hierba	

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
<i>Tripogandra disgrega</i> (Kunth) Woodson	hierba	
CYPERACEAE		
<i>Bulbostylis funckii</i> (Steud.) C. B. Clarke	hierba	
<i>Bulbostylis juncoides</i> (Vahl) Kük.	hierba	
<i>Cyperus aggregatus</i> (Willd.) Endl.	hierba	
<i>Cyperus arsenei</i> O'Neill & B. Ayers	hierba	
<i>Cyperus seslerioides</i> H.B.K.	hierba	
<i>Cyperus spectabilis</i> Link	hierba	
DIOSCOREACEAE		
<i>Dioscorea galeottiana</i> Kunth	hierba trepadora	
<i>Dioscorea minima</i> B.L. Rob. & Seaton	hierba	
GRAMINEAE		
<i>Aegopogon tenellus</i> (DC.) Trin.	hierba	
<i>Bromus carinatus</i> Hook. & Arn.	hierba	
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	hierba	
<i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link	hierba	
<i>Lasiacis nigra</i> Davidse	arbusto	
<i>Lycurus phalaroides</i> H.B.K.	hierba	
<i>Muhlenbergia ciliata</i> H.B.K.	hierba	
<i>Muhlenbergia diversiglumis</i> Trin.	hierba	
<i>Muhlenbergia macrotis</i> (Piper) Hitchc.	hierba	
<i>Muhlenbergia minutissima</i> (Steud.) Swallen	hierba	
<i>Oplismenus burmannii</i> (Retz.) Beauv.	hierba	
<i>Panicum bulbosum</i> H.B.K.	hierba	
<i>Paspalum tenellum</i> Willd.	hierba	
<i>Piptochaetium virescens</i> (H.B.K.) Parodi	hierba	
<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Büse	hierba	
<i>Schizachyrium sanguineum</i> (Retz.) Alston	hierba	

Apéndice. Continuación

Nombre científico	Forma de vida	Uso(s)
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	hierba	
<i>Trachypogon secundus</i> (Presl) Scribn.		
HYPOXIDACEAE		
<i>Hypoxis mexicana</i> Schult.	hierba	
IRIDACEAE		
<i>Nemastylis tenuis</i> (Herb.) S. Watson	hierba	
<i>Sisyrinchium cernuum</i> (E. P. Bicknell) Kearney	hierba	
<i>Sisyrinchium tenuifolium</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	hierba	
ORCHIDACEAE		
<i>Anathallis minutalis</i> (Lindl.) Pridgeon & M. W. Chase	hierba	
<i>Bletia neglecta</i> Sosa	hierba	
<i>Bletia rosea</i> (Lindl.) Dressl.	hierba	
<i>Encyclia venosa</i> (Lindl.) Schltr.	epifita	
<i>Habenaria guadalajarana</i> S. Watson	hierba	
<i>Isochilus bracteatus</i> (La Llave & Lex.) Salazar & Soto Arenas	hierba	
<i>Laelia autumnalis</i> (Lex.) Lindl.	epifita	ceremonial y ornamental
<i>Leochilus hyalinobulbon</i> (Lex.) Schltldl.	epifita	
<i>Malaxis carnosa</i> (H.B.K.) Schweinf.	hierba	
<i>Malaxis rosei</i> Ames	hierba	
<i>Malaxis unifolia</i> Michx.	hierba	
<i>Spiranthes pyramidalis</i> Lindl.	hierba	
<i>Spiranthes schaffneri</i> Rchb. f.	hierba	
<i>Stelis resupinata</i> (Ames) Pridgeon & M.W. Chase	epifita	
<i>Triphora triantophora</i> (Sw.) Rydb.	hierba	